

## TNM nach AJCC 2002

<b>Tis</b>	Clark Level I
<b>T1a</b>	≤ 1mm und Clark Level II oder III ohne Ulzeration
<b>T1b</b>	≤ 1mm und Clark Level IV oder V oder Ulzeration
<b>T2a</b>	> 1mm und ≤ 2mm ohne Ulzeration
<b>T2b</b>	> 1mm und ≤ 2mm mit Ulzeration
<b>T3a</b>	> 2mm und ≤ 4mm ohne Ulzeration
<b>T3b</b>	> 2mm und ≤ 4mm mit Ulzeration
<b>T4a</b>	> 4mm ohne Ulzeration
<b>T4b</b>	> 4mm mit Ulzeration
<b>N1a</b>	Mikrometastase eines Lymphknotens
<b>N1b</b>	Lymphknotenmetastase (klinisch erkennbar mit hist. Bestätigung oder extrakaps. Ausdehnung)
<b>N2a</b>	Mikrometastase in 2 bis 3 Lymphknotens
<b>N2b</b>	2-3 Lymphknotenmetastase (klinisch erkennbar mit hist. Bestätigung oder extrakaps. Ausdehnung)
<b>N2c</b>	Intransitmetastase oder Satellitenmetastasen
<b>N3</b>	> 3 Lymphknotenmetastasen oder Intransitmetastase mit Satellitenmetastase
<b>M1</b>	Haut-, Lymphknoten oder Weichteilfernmetastasen
<b>M2</b>	Lungenmetastasen
<b>M3</b>	Viszerale Fernmetastasen, Metastasen und LDH Erhöhung

## Klinisch-pathologisches Stadium

<b>0</b>	Tis	N0	M0
<b>IA</b>	T1a	N0	M0
<b>IB</b>	T1b	N0	M0
	T2a	N0	M0
<b>IIA</b>	T2b	N0	M0
	T3a	N0	M0
<b>IIB</b>	T3b	N0	M0
	T4a	N0	M0
<b>IIC</b>	T4b	N0	M0
<b>IIIA</b>	T1-4a	N1a	M0
	T1-4a	N2a	M0
<b>IIIB</b>	T1-4b	N1a	M0
	T1-4b	N2a	M0
	T1-4a	N1b	M0
	T1-4a	N2b	M0
	T1-4a/b	N2c	M0
<b>IIIC</b>	T1-4b	N1b	M0
	T1-4b	N2b	M0
		N3	M0
<b>IV</b>			M1